



Pavo Foal Milk

Gebruiksaanwijzing

Bereiding van 1 liter veulenmelk

1. Neem een pan met een inhoud van minimaal 1 liter.
2. Doe hierin 300 ml koud water.
3. Vul dit aan met 400 ml kokend water. U heeft nu 700 ml water met een temperatuur van $\pm 60^{\circ}\text{C}$.
4. Voeg 1 maatschepje (= 100 gram) Pavo Veulenmelk poeder toe en roer tot alle veulenmelkpoeder is opgelost.
5. Voeg al roerend 300 ml koud water toe. U heeft nu 1 liter handwarme veulenmelk (temperatuur van $\pm 40^{\circ}\text{C}$).
Veulenmelk van Pavo mag u met behulp van een magnetron opwarmen.

Voedingsschema (moederloos) paardenveulen (geboortegewicht van 50-60 kg)

leeftijd	Pavo Foal Milk		Goed hooi (kg/dag)	Pavo Podo@Start (kg/dag)	Pavo Podo@Grow (kg/dag)
	Aantal voedingen per dag	ml per voeding			
Dag 1 – 2*	18	400			
Dag 3 – 4	12	650			
Dag 5 – 7	10	850			
Week 2 – 3	8	1300			
Week 4 – 5	8	1500	0.5	0.3	
Week 6 – 9	6	2500	0.8	0.5	
Week 10 – 12	6	1500	1.4	0.8	
Week 13 – 15	4	750	2.2	1.2	
Maand 4 – 5			2.5	1.5	
Maand 6 – 8			3.1	2.0	2.0
Maand 9 – 12			3.7		1.5
Jaar 1 – 2			4.3		1.5
Jaar 2 – 3			5.0		1.5

* De eerste 2 dagen de voedingen verrijken met Pavo Colostrum voor paarden.

Voedingsschema (moederloos) ponyveulen (geboortegewicht van ongeveer 30 kg)

leeftijd	Pavo Foal Milk		Goed hooi (kg/dag)	Pavo Podo@Start (kg/dag)	Pavo Podo@Grow (kg/dag)
	Aantal voedingen per dag	ml per voeding			
Dag 1 – 2*	18	240			
Dag 3 – 4	12	400			
Dag 5 – 7	10	540			
Week 2 – 3	8	830			
Week 4 – 5	8	1000	0.3	0.1	
Week 6 – 9	6	1600	0.5	0.2	
Week 10 – 12	6	950	0.9	0.4	
Week 13 – 15	4	450	1.4	0.5	
Maand 4 – 5			1.6	1.0	
Maand 6 – 8			2.0	1.5	1.5
Maand 9 – 12			2.4		1.0
Jaar 1 – 2			2.8		1.0
Jaar 2 – 3			3.2		1.0

* De eerste 2 dagen de voedingen verrijken met Pavo Colostrum voor paarden.

Voedingstips

- Wanneer het veulen de (biest)melk niet goed wil drinken kunt u de eetlust opwekken door een beetje suiker op de tong te strijken.
- Forceer de opname van voeding niet door het hoofd van het veulen achterover te buigen, het kan dan niet goed slikken en de kans bestaat dat er melk in de longen terecht komt.
- Verstrek niet meer dan 500 ml biestmelk per uur. Een te hoge opname kan leiden tot darmstoornissen.
- Zorg voor goede hygiëne. Bereid de melk met schone handen, en spoel speen, fles en drinkbakken grondig schoon na gebruik.

Wilt u voedingsadvies op maat voor uw paard of pony, bel dan met het Pavo Grooming Team.

Nederland: 0900-paarden (7227 336), lokaal tarief. België: 078-185555 (€ 0,05 p.m.).

Voor meer informatie en contactadressen kunt u terecht op onze website www.pavo.net